



แถลงการณ์พิเศษ

“ไขจบสิ้น”

ของ

กองบรรณาธิการ กรมสาธารณสุข

ไขจบสิ้นคืออะไร ?

ไขจบสิ้นเป็นโรคที่มีอาการครบถ้วน เช่น เหนื่อย มีไข้สูง ประกอบกันไปกับอาการ ระบายน้ำจืด และปวดศีรษะมาก ไข้อาจจับอยู่ได้นานราว สอง สาม ชั่วเวลาพักแล้ว ก็สว่าง อาจเป็นซ้ำได้อีก ทุก ๒ วัน หรือทุก ๓ วัน ถ้าเป็นชนิดร้ายแรง บางทีผู้บวญ อาจเป็นไขเช่นนี้ อยู่ได้ หายลับตาห้

เหตุของไขจบสิ้นนั้น คืออะไร ?

ไขจบสิ้นเกิดโดยมีเชื้อโรค ชนิดหนึ่ง อยู่ในโลหิตของผู้บวญ เชื้อโรคเหล่านี้ อยู่ในเม็ดโลหิตแดง ซึ่งอาจเห็นได้เมื่อเอาโลหิตของผู้บวญ ตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

ทำไมเชื้อโรคจึงอยู่ในโลหิตของผู้ป่วยได้?

เชื้อโรคอยู่ในโลหิตของคนใดก็ได้ เมื่อคนนั้นถูกยุงก้นปล่องกัด และยุงนั้นได้กัดผู้ป่วยด้วยไซ้จับมันมาแล้ว

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

เมื่อยุงกัดผู้ป่วยเป็นไซ้จับมัน ซึ่งมีเชื้อโรคไซ้จับมันอยู่ในโลหิตนั้นแล้ว ก็ดูดโลหิตของผู้ป่วยเข้าไปในปากและท้อง ค่อยไปเมื่อยุงนั้นมากัดใครเข้า เชื้อโรคซึ่งเกิดขึ้นในตัวของมันเองมาจากเชื้อโรคที่ยุงได้รับมาจากผู้ป่วยนั้น ก็เข้าไปสู่โลหิตของผู้ที่ถูกยุงกัด

เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายคนแล้ว จะเป็นอย่างไรต่อไป?

เชื้อโรคได้เข้าไปถึงเม็ดโลหิตแดง และกินเม็ดโลหิตแดง ซึ่งในที่สุดก็แตกและเชื้อโรคกระจาย ถัดจากนั้นเชื้อโรคที่กระจายแล้ว ก็ไปเกาะเม็ดโลหิตแดงอื่น ๆ และทำอันตรายแก่เม็ดโลหิตแดง เช่นวิธีที่กล่าวมา

เชื้อไซ้จับมันมีกี่ชนิด?

เชื้อไซ้จับมันนั้นกล่าวโดยย่อ มีอยู่ ๓ ชนิด ชนิดหนึ่งก็ทำให้ปรากฏอาการของไซ้จับมันต่างกันออกไป คือ ชนิดหนึ่งทำให้เป็นไซ้จับวันเว้นวัน ชนิดหนึ่งเป็นไซ้จับวันเว้นสองวัน และอีกชนิดหนึ่งจับทุกวัน

เหตุของอาการ ครั่น ตัว และ ไข นั้น คือ อะไร ?

เมื่อ เม็ด โดฮีต แดง แดก ตัว เชื้อ โรค ไม่ เพียง แต่ กระจาย เท่านั้น พิษ ของ มัน ก็ กระจาย ไป ทวี ร้าง กาย ด้วย พิษ ของ เชื้อ โรค ที่ กระจาย และ เม็ด โดฮีต แดง ที่ ตอง แดก ออก นเอง เป็น มุขเหตุ ของ อาการ ครั่น เนื้อ ครั่น ตัว และ ไข

ไข จับ ต้น จะ เป็น โดย วิชา นอก จาก ถูก ยุง ที่ มี เชื้อ โรค กัด ได้ หรือ ไม่ ?

ไม่ได้ เลย ไข จับ ต้น จะ เกิด จาก น้ำ ด้ง ปรก อาหาร ตก แดด ตก หน้า คาง หรือ โดย ทาง ใด ไม่ ได้ นอกจาก ถูก ยุง ที่ กัด ผู้ บ่วย เป็น ไข จับ ต้น มา แลว กัด เอา เท่านั้น

ไข จับ ต้น แพร่ หตาย อย่างไร ?

มี ข้อ สำคัญ อยู่ ๓ อย่าง เนื่อง ใน การ แพร่ หตาย ของ ไข จับ ต้น คือ

๑. ผู้ บ่วย เป็น ไข จับ ต้น ซึ่ง มี เชื้อ โรค อยู่ใน กาย
๒. ยุง ก้น ปล่อง ที่ กัด และ คด โดฮีต ไป จาก ผู้ บ่วย นั้น และ
๓. ๑ คน ปกติ ที่ ถูก ยุง อัน มี เชื้อ โรค นั้น กัด

ยุง ก้น ปล่อง กับ ยุง ชนิด อื่น ซึ่ง ไม่ เป็น พาหะ ของ ไข จับ ต้น นั้น ต่าง กัน อย่างไร ?

ต่าง กัน หตาย ประการ แต่ ที่ สำคัญ และ ซึ่ง จะ ตรวจ ได้ ด้วย ตาเปล่า โดย ง่าย นั้น คือ ยุง ชนิด ก้น ปล่อง บัก มี ตาย เป็น จุด ๆ ชนิด ธรรมดา บัก ไม่ มี ตาย จุด เวลา ที่ เกาะ อยู่ กับ ฝา ผนัง ยุง ชนิด ธรรมดา

เกาะในท่าเหยียดตัว หัวชี้ตรงไปยังเพดาน ถ้าตัวทอดขนานกับฝาผนัง ส่วนของชนิดกันปล่องนั้น เกาะโดยเอาหัวชี้ตรงฝาผนัง ส่วนแหลมที่หัวและถ้าตัวทอดเป็นเส้นตรงออกมาแนวเดียวกัน และตั้งเป็นมุมกับฝาผนัง

ยุ่งกันปล่องมักกัดคนเวลาไหน ?

ไม่มีใครกัดเวลากลางวัน มันมักตื่นตกใจง่าย และเพราะฉะนั้นจึงชอบกัดคนเวลานอนหลับ

ยุ่งเพาะพันธุ์ได้ยังไง ?

เมื่อตูดเลือดกินแล้ว ยุ่งตัวเมียก็ไข่ไว้บนพิน้ำ และภายในสองสามวันไข่ก็ฟักออกเป็นตัวลูกน้ำ ลูกน้ำเหล่านี้อาศัยอยู่ในน้ำและในไม้ซากก็กลายเป็นตัวแก่ ซึ่งในที่สุดก็เป็นยุ่ง ความเปลี่ยนแปลงของยุ่งทุก ๆ ระยะเวลาหนึ่ง เจริญไปในน้ำ สำหรับยุ่งกันปล่องกินเวลาดังแต่ ๓๒ ถึง ๓๖ วัน

ลูกน้ำยุ่งกันปล่องกับลูกน้ำยุ่งอื่น ๆ นั้น ต่างจากกันอย่างไร ?

ตัวลูกน้ำซึ่งเกิดจากไข่ของยุ่งชนิดกันปล่องนั้น ต่างกับตัวลูกน้ำซึ่งเกิดจากไข่ยุ่งชนิดอื่น ๆ โดยตัวลูกน้ำชนิดที่เป็นยุ่งกันปล่องนั้นเมื่อขึ้นมาถึงพิน้ำแล้วจะลอยตัว คือถ้าตัวทอดขนานไปกับพิน้ำ ส่วนลูกน้ำซึ่งเกิดจากไข่ของยุ่งชนิดอื่น ๆ นั้นลอยคอ คือถ้าตัวทอด

เป็นมุ่มกับพบน้า โผล่แต่ท้อหายใจยาว ชนมา อย่างเดียวเท่านั้น
 เมื่อถูกน้ำยุงก้นปล่องถูกรบกวน มักจะว่ายน้ำไปตามพบน้า ส่วน
 ลูกน้ำยุงอย่างอื่นนั้น จะดำหนิงต่างต่างเสมอ

ทำไมเราจึงจำเป็นต้องรู้จักลักษณะของลูกน้ำยุงก้นปล่อง ?

เพื่อเราจะได้ออกหาที่เพาะพันธุ์ของมัน และทำลายที่เหตานั้น
 ได้เสียได้

ยุงก้นปล่องเพาะพันธุ์ในที่อย่างไร ?

ชอบเพาะพันธุ์ในน้ำสะอาด เช่นตามแอ่งน้ำ บ่อน้ำที่ล้อมตาม
 พงหญ้าในตำบารเล็ก ๆ และในที่น้ำไหล (นอกจากที่ไหลเชี่ยว)
 ยุงก้นปล่องเพาะพันธุ์ในที่ ๆ มีน้ำขังอยู่แทบทุกแห่ง นอกจากน้ำ
 พนจะสกปรกมากเต็มที่ โดยมากไม่ชอบเพาะพันธุ์ตามถ้ำน้ำ กระ
 บ่อ หรือภาชนะอื่น ๆ เว้นแต่ถ้ำมหรญา ๆ ต ๆ งอกในนั้นด้วย

น้ำจะต้องขังอยู่นานเท่าใด ยุงก้นปล่องจึงจะเป็นตัวชนได้ ?

เพราะเหตุว่า กว่าไข่จะแตกเป็นตัวยุงชนได้ ก็จะต้องเป็นเวลายาว
 นานราว ๓๕ วัน เพราะณนถาน้ำแห้งเสียเร็วกว่าน ไข่ยุงก้นปล่อง
 อาจไม่เป็นตัวชนได้

จะควบคุมหรือป้องกันไข่ยุงก้นปล่องได้อย่างไร ?

๑. โดยทำลายยุงก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะของโรคเสีย

- ๒. โดยบังเอิญ อย่าให้ยุ่งเหยิง เกตุน กตคนใด
- ๓. โดยดูแลผู้บวชด้วยโรคนี้ อย่าให้ยุ่ง กต และดูแล เชื้อโรคไปได้
- ๔. โดยจัดการ อย่างหนึ่ง อย่างใด ให้แก่คน บกต จนแม้ว่าถูก
ยุ่งทมิ เชื้อโรค กต ก็จะไม่เป็นไข้จับต้นได้

จะกำจัดยุ่งกัน ปดองได้ อย่างไร ?

โดยทำลายที่ อยู่ และที่ เพาะพันธุ์ ของ มนุษย์ ในการ นจก ตอง
ถางหญ้า และพุ่มไม้ ทมิ อยู่ รอบบ้าน และ รอบ ที่ เพาะ พันธุ์ ของ ยุง นน
ที่ เพาะ พันธุ์ ของ ยุง อ.จ ทำลายได้ โดย ระบายน้ำ ออกจาก บ่อ หลุม ๆ ด ๆ
หรือ ถม เศษ และ โดยใช้น้ำมัน กาค หรือ ชนิด อื่น ๆ ราด ลง ใน ที่ ๆ ไม่
สามารถ จะ ระบายน้ำ ออก หรือ ถมได้ การ ระบายน้ำ ออก และ ถม บ่อ
หลุม ต่าง ๆ นั้น ทำให้ น้ำ ที่ ชง อยู่ แห่ง หมดไป ยุง จึง ไข่ ไม่ได้ และการ
ราด น้ำมัน ลง ใน น้ำ นน ทำให้ มี ฝา อยู่ บน ผิว น้ำ ซึ่ง บัง กัน มิ ให้ ลูก น้ำ
มี อากาศ หายใจ ได้ แลว ลูก น้ำ ก็ ตาย

จะ ต้อง ราด น้ำมัน ดัง กี่ ครั้ง ?

อย่าง น้อย ควร ราด น้ำมัน ทุก ๆ ๓๕ วัน ต่อ ครั้ง บ่อ บาง แห่ง
กว้าง เกิน กว่า ที่ จะ ราด น้ำมัน ได้ หรือ มี หญ้า ชน มาก ซึ่ง บัง กัน มิ
ให้ น้ำมัน ลอย เป็น ฝา ได้ ตลอด ใน ราย เช่น น ตอง หา หน ทาง ที่ จะ ทำ ให้
น้ำ ลึก ปรก และ มี กต น เหม น ชน เช่น ไข่ ฟอง ลมู นวม น ดน ดี่ ยอม ฝา ๆ ด ๆ
เหล่านี้ ราด เป็น ต้น ปลา เต็ก บาง ชนิด เช่น ปลา กต กิน ลูก น้ำ เป็น อาหาร

จะบ่งกันยุ่งกัน ปดองไม่ให้กต คนดีได้อย่างไร ?

วชททุกคน น่าจะทำได้นนคอ กางมุงนอน มุงนนควรเปน
ชนิดคาถิ และไม่มีประคุ ควรให้มีขนาดเท่ากับที่นอน เวตากาง
ดิน มุงควรยดเขาไตทนอน อย่าปดอยห้อยไว้

จะปฏิมคแก่ผู้บ่วย อย่างไร จึงจะให้ยุ่งที่มากตไม่คิตโรคไปได้ ?

โดยผู้บ่วยได้บับคโรคของคณจนหายคณิท และไม่มีเชอโรค
ในโตหิต ในขณะที่เป็นโรคอยู่ณั้ ผู้บ่วยจกคองนอน กางมุงเปน
นิจเพื่อบองกันมิให้ถูกยุ่งกต และนำเชอโรคไปคิตคณอื่น

ผู้ที่ไม่เปนโรคนี้ จะทำอย่างไรจึงจะไม่คิตโรคได้ ถึงแม้จะถูกยุ่งที่มี

เชอโรคกตก็ตาม ?

โดยกินยาควณน เปนปริมาณเด็กน้อยในฤดูที่มีไซจับคัณเกิดชกชม
ตามค้ำณะนำของแพทย เช่นน ถึงแม้ผู้นนจะถูกยุ่งที่มีเชอโรคกต
ยาควณนก็จะฆ่าเชอไซจับคัณคัณได้

จะต้องกินยาควณน เปนปริมาณสักเท่าใด ?

สำหรับรายที่เป็นไซจับคัณชนิดรวดเร็ว กินยาควณน ๕๐
๓๐ เกรน วันละ ๓ ครั้งราวสามหรือสี่วัน เปนอย่างน้อย คอไปกิน

๕๐
ควณน ๑๐ เกรนทุกคณก่อนนอนอก ๘ สัปดาห์ สำหรับผู้บ่วยที่ไม่ปรากฏ
อาการรวดเร็ว กินแต่เพียงทุกคณ ๘ สัปดาห์ก็พอ

ปริมาณสำหรับเด็กน้อยลงมา
ตามปริมาณซึ่งแพทย์จะแนะนำให้
แล้วแต่ขีดอายุและควรให้ยา

